


# A kutyák egyéni féregtelenítésének programja



KUTYÁK KIEGÉSZÍTŐ KEZELÉSEI	
<b>Orsóféreg</b>	
Kölykök	A megszületés utáni 14. napon, aztán 14 naponként, legfeljebb az elválasztás utáni 2 hétig, és aztán havonta kezelések hat hónapos korig.
Vemhes szukák	A kölykökbe való átjutás csökkentése érdekében a vemhes szukáknak a vemhesség 40. és az 55. napján makrociklikus laktion vagy fenbendazol a vemhesség 40. napjától naponta az ellés utáni 2. napig adható.
Szoptató szukák	A kölykök első kezelésével egyidejűleg kell kezelni (lásd fent).
Kutyák fokozott fertőzési kockázattal, pl. azok, amelyeket sportban, versenyeken, kiállításokon használtak vagy kennelekben tartottak stb.	Két kezelés: az esemény előtt maximum 4 héttel és 2-4 héttel az esemény után. Kennelek részére: havonta egyszer alkalmazni a tervezett féregtelenítést, vagy négy hetente megvizsgálni a bélsármintákat, és a leletek szerint kezelni.
Szolgálati kutyák, pl. terápiás, mentő vagy rendőrségi kutyák	A kockázatbírálástól függően havonta egyszer alkalmazni a tervezett féregtelenítést, vagy havonta megvizsgálni a bélsármintákat, és a leletek szerint kezelni.
Kutyák, amelyek 5 éves kor alatti gyermekekkel vagy immunhiányos egyénekekkel osztják meg az otthonukat.	A kockázatbírálástól függően havonta egyszer alkalmazni a tervezett féregtelenítést, vagy havonta megvizsgálni a bélsármintákat, és a leletek szerint kezelni.
<b>Galandféreg</b>	
<i>Echinococcus</i> -fajokra nézve endémiás területekre történő utazás vagy onnan behozatal	A nagy fertőzésveszélynek kitétt kutyákat 4 héttel az utazás megkezdése után, majd 4 hetente a visszatérés után 4 hétig kezelni kell. Behozatal után azonnali vizsgálat és kezelés javasolt.
Nyers húst és/vagy belsősegeket fogyaszt, zsákmányt eszik, vagy megy vadászni	A kutyákat 2-3 havonta kell bélsárvizsgálattal ellenőrizni, és a leletektől függően kezelni, vagy 6 hetente féregteleníteni.
Bolha vagy rágótetű (mint a <i>Dipylidium</i> vektorai) okozta fertőzöttség	Egyszer, amikor a fertőzés létrejött.
<b>Szívféreg (<i>Dirofilaria immitis</i>)*</b>	
Kutyák, amelyek szívféregre endémiás területeken élnek	Profilaktikusan, havonta makrociklikus laktionokkal a lárvák elleni kezelés a szünyogszezon alatt.
Utazás vagy behozatal/kivétel a szívféregre endémiás területekre/területekről	Nem később, mint 30 nappal az elindulás előtt, majd 30 nappal a lehetséges utolsó utazási nap után havonta kezelni.

- A féregtelenítést mindig az állatorvos szakember tanácsa alapján kell elvégezni. A bélsár rendszeres koprologiai vizsgálata, amint azt az A és B Csoportnál javasolt, jó alternatíva a szokásos féregtelenítési eljárásokkal szemben.
  - Ha egy állat egyéni kockázatát nem lehet egyértelműen megítélni, akkor az állatot évente meg kell vizsgálni vagy legalább négyszer kell féregteleníteni. Tanulmányok kimutatták, hogy az évente 1-3 alkalommal végzett féregtelenítés nem nyújt elegendő védelmet. A 3 havonta történő féregtelenítés nem feltétlenül szünteti meg a patens fertőzöttséget.
- \* Részletes információk a kutyák és a macskák szívféreg fertőzöttségéről az ESCCAP 5. Irányelvben található: "A kutyák és a macskák vektor közvetítette betegségei elleni védekezés" a [www.esccaphungary.hu](http://www.esccaphungary.hu), és angol, ill. egyéb nyelven a [www.esccap.org](http://www.esccap.org) oldalon.